

Mme X a été hospitalisée le **1er février** pour un infarctus du myocarde. Elle s'est présentée aux **urgences à 8 h 30** en raison d'une **douleur thoracique évoluant depuis 3 h 30** du matin. Elle a été admise en soins continus et a bénéficié d'un traitement par **Héparine, Xylocaïne et Potassium**.

Elle a présenté 1 heure après son arrivée une **fibrillation ventriculaire** traitée par choc électrique externe. L'évolution a également été compliquée 1 heure plus tard par un **œdème pulmonaire**, traité par Lasilix.

Elle a bénéficié d'une mobilisation progressive et a **quitté les soins intensifs le 6 février**.

Il a été transféré à Nancy **le 17 février pour une coronarographie** qui a mis en évidence une obstruction de l'interventriculaire antérieure moyenne. La ventriculographie montre une hypokinésie antérieure [...].

Elle nous a été re-transférée le mercredi 19 février et a **regagné son domicile le 22**.

La réadaptation phase 1 s'est poursuivie jusqu'à ce jour sans complication.

Le test d'effort est sous maximal négatif à 90 Watt sans trouble du rythme.

La réadaptation de phase 2 débutera lundi 24 février en ambulatoire.

Le traitement comporte : **Lipanthyl, Furosémide, Risordan 20 mg x 2, Chlorure de Potassium**.